

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

證治準繩卷九十

詳校官太醫院吏目臣宋桂

編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士

臣朱

鈴

校對官助教

臣

羅萬選

膳錄監生

臣

姚培雯

欽定四庫全書

證治準繩卷九十

明 王肯堂 撰

幼科

脾臟門

瀉

曾論瀉之原有冷瀉熱瀉傷食瀉水瀉積瀉驚瀉風瀉
臟寒瀉疳積瀉瀉積種種不同各分於後 冷瀉多是

白水瀉密而少腹痛而鳴眉皺目慢面帶白色額有汗

多用冲和飲

慢驚

當歸散

潮熱

合和水喂薑煎服并守中湯

本參苓白朮散

不乳食

益中膏

本條

沉香檳榔丸

不乳食

治之

熱瀉大便黃色如同弔水瀉過即止半日復然心煩

口渴小便黃少食乳必麤先用五苓散

驚

或大順飲

吐

次以錢氏白朮散

渴

主之香薷散

吐瀉

亦佳

傷食瀉乃

脾胃素弱復為生冷果食所傷故大便不聚而瀉或因

乳母養生冷肥膩之物自乳而過亦能作瀉面唇俱白

瀉稀而少或如壞雞子腥臭異常身形黃瘦宜先溫正

胃氣次理積而後固脾冲和飲

慢驚

當歸散

潮熱

合和水煨

薑棗子煎服理積兒大者烏犀丸

吐

小者化癖丸

癖

三

稜散

宿食

固脾和中散

吐瀉

醒脾散

慢驚

水瀉謂之洞泄乃

陰陽不順米穀不分瀉黃水而小便少番次密而無度

是夏秋之際晝則解衣取涼夜則失蓋感冷冷熱相激

清濁渾亂或因母自熱中來乳有熱氣遽以哺之令兒

脾胃不和水穀交雜而下以嘔咀五苓散

驚

加薏苡仁

車前子半夏水薑煎服分正陰陽或先用大順飲

吐溫

白湯調下香薷散

吐瀉

調中止補錢氏白朮散

瀉

六和湯

吐瀉亦好

積瀉脾氣虛弱乳食入胃不能運化積滯日

久再為冷食所傷傳之大腸遂成泄瀉留連不止諸藥

無効蓋以積在脾胃積既未除何由得愈宜先去積後

止瀉瀉止實脾則病除矣三稜散

宿食

烏犀丸

吐續用沉

香櫝榔丸

不乳食

參苓白朮散

慢驚

和中散

吐瀉

香橘餅

本條

調

理驚瀉糞青如苔稠若膠粘不可便止但鎮心抑肝

和脾胃消乳食斯為治法先投五苓散驚次用三稜散

宿食水薑倉米煎服或三解散潮熱神麴生薑煎湯調服及

沉香檳榔丸不乳食不驚丹驚調治風瀉慢驚大病後

有之其糞稀黃褐色或夾不消乳食同下此因脾虛所

致或夾黑褐色者屬腎蓋脾虛為腎水所乘故也若久

不進飲食再有驚搐宜疎腎水去脾風次補脾則自愈

庶無復作之患疎腎水呶咀五苓散驚加黑牽牛半生

半炒并薏苡仁水薑煎服去脾風瀉黃散脾調脾氣參

苓白水散

食不乳

臟寒瀉糞如青竹色不稀不稠或下

青水未瀉時腹痛而鳴呌哭方瀉多是生來三五月內

有此周歲則無始因斷臍帶短風冷自外逼內而成此

疾先用冲和飲

慢驚

水葱白煎投溫中解表次以當歸散

潮熱

水煨薑煎服及投勻氣散

症

理中湯

吐瀉

疳積釀瀉

其候面色痿黃肚脹脚弱頭大項小髮稀且堅肌肉消
瘦不思飲食晝涼夜熱或腹內有癥瘕氣塊瀉則顏色
不等其臭異常其瀉有時或一月半月旬日一番自瀉

自止名為疳積。釀瀉先以當歸散熱潮加以三稜陳皮水。

薑煎服。次投烏犀丸吐沉香檳榔丸食不乳及化癖丸癖。

蘆薈丸疳沒石子丸條本。兒最小者難下。九子止投三稜。

散宿食快膈湯痞自然全愈。若瀉或痢色青甚而淡黃。

夾白寒多熱少。此陰邪勝陽。宜用守中湯。胃苓湯俱本條。

與服扶表救裏方。進當歸散熱潮加陳皮紫蘇水。薑糯米。

煎服亦宜。和解理中湯吐瀉清米飲。空心調服。溫脾去濕。

益氣清神寒盛者。理中湯內加熟附子水。薑棗煎服。次。

投南星腹皮飲水薑煎服和脾胃去陰邪 若瀉或泄
色青淡而有沫黃稠熱多寒少亦致面黃肌瘦煩躁不
寧宜以呔咀五苓散加薏苡仁車前子水薑煎服解散
餘邪仍用茵陳蒿梔子仁煎湯調細末五苓散溫服退
黃色消陽毒及當歸散水薑棗煎投或服萬安飲熱積四
神丸

養生治大小老虛之人不拘冷熱泄瀉 黃連去鬚白芍

藥

並劉
如豆

吳茱萸

各十
兩

右三味釜內慢火炒赤色放冷杵羅為細末每服三錢七水一盞半煎至八九分去滓空腹食前溫服日三四服小兒量與或以水浸蒸餅丸如桐子大更丸一等如萊豆黃米大小兒每服十五丸至二十九溫米飲下若作散以沸湯或溫米飲調下並可服病泄痢之人若不禁生冷魚肉肥膩與不服藥同 一方有木香無芍藥醋糊丸

茅先生香連丸

治瀉利

木香

黃連

茱萸半兩同於飢內炒令

煙起取出
去茱萸

肉豆蔻

訶子

炮去核
各半兩

阿膠

麩炒

朱砂

各一

錢

右為細末軟飯為丸如桐子大每服十九十四丸用飯飲吞下兒小碎之

乳香散

治一切瀉痢

乳香

二錢用荷葉於炭火上炙令半鎔放地上揅蓋

另研

肉豆蔻

白薑

甘草

炙

草菓子

各一兩

右細剉用醋麩裹於熱灰內煨令赤色取出去麩為末入乳香末拌勻每服半錢一錢陳米飯飲調下

冷瀉薛湯氏云冷瀉者乃脾胃虛寒水穀不化而泄錢

仲陽云小兒不能食乳瀉褐色身冷無陽也當用益黃

散脾加減治之大便清白口不煩渴冷積瀉也理中湯

吐主之若口鼻吸風寒之氣脾胃受生冷之食而作者

先用理中湯後用異功散命門火衰不能溫蒸中州之

氣故脾胃虛寒者用益黃散及八味丸腎脾胃虛弱者

五味異功散吐瀉脾氣下陷者補中益氣湯虛熱脾氣虛寒

者人參理中湯寒水侮土者益黃散肝木乘脾者四君

柴胡散手足並冷者加木香乾薑治者審之 百問云

冷積瀉沒石子丸極効人參散吐理中湯吐加減服尤

佳更加肉豆蔻則止來復丹大科中暑不換金正氣散吐皆

可觀音散吐銀白散加減調治乃平和之劑也

守中湯 理春夏相交陰濕氣重中傷脾胃致腹痛泄

利經久不止漸傳手足浮腫飲食少思 桔梗去炒

蒼木米泔水浸一宿去麁皮瀝乾剉片炒微黃色各二兩白薑四錢甘草六錢

炙

右件劉焙為末每服一錢空心沸湯調服咬咀水煎亦可或用薑棗

沒石子丸 治嬰孩先因冷瀉或作赤白痢候久而變

作諸般異色不止一端外證面或青或白唇舌乾焦手微冷渾身溫壯肚內刺痛啼叫睡卧不安若有是

候當服 沒石子 木香 黃連 當歸 青皮

各二

錢半

右五味為末阿魏一分酒半盞浸化入麪少許令勻

煮糊為丸如粟米大一二歲兒服如椒自大者四五
六歲兒服每服五十九赤痢甘草湯下白痢乾薑湯
下或五倍子湯下

張渙川椒丸 治小兒夏傷濕冷入腸胃泄瀉不止

川椒

一兩去閉目雙者并黑子
揀淨慢火炒香熟為度

肉豆蔻

半兩

右件搗羅為細末粳米飯和圓如黍米大每服十粒
米飲下量兒大小加減

粟煎湯 治腸胃受風令泄注不止身體壯熱 白朮

炮當歸洗焙乾

川芎

人參去芦頭

肉桂

芍藥各一兩

右件搗羅為細末每服一錢水一小盞入生薑三片粟米一匙頭許煎至五分粟米熟去滓放溫服

溫中丸 治胃寒瀉白腹痛腸鳴

方見吐瀉

孔氏治藏府不調大便青色 白朮 人參 茯苓各一

錢甘草炙半錢

右末一錢水一小盞煎七分溫服

丹溪云瀉青亦是寒宜用蘇合香丸平胃散各等分蜜

湯調服

田氏云便青者因驚風內藏脾氣不和宜白朮湯

熱瀉湯氏云小兒熱瀉者大便黃而赤或有沫乃臟中有積或因乳母好飲酒或嗜熱物或生下傷濕蘊熱醫者不明但用豆蔻訶子等藥服之如水澆石既不識其證故不辨其冷熱用藥又不得其法焉能取効此證當以小便赤少口乾煩躁為驗治法當用錢氏白朮散渴去木香用之五苓散驚去桂亦可服其熱甚者四逆散

大柴胡湯

俱傷寒

去大黃服之殊驗也更用黃連九

疳等

劑亦佳調中湯

痢

去大黃加黃連枳殼如夾熱而瀉太

陽與少陽合病自下痢者與黃芩湯嘔者加半夏又有

挾熱瀉痢而小便秘澀赤甚者加減四順清涼飲

裏熱

治

之即止

薛氏云右腮色赤飲冷胃經實熱也用瀉黃

散

脾

惡冷喜熱胃經虛熱也用白朮散

渴

右腮及額間

俱赤心脾翕熱也用瀉黃散加炒黑黃連若左頰右腮

俱赤肝火乘脾土也用四君子湯

吐瀉

加柴胡若兒暴傷

乳食用保和丸

宿食

乳母尤當忌厚味節飲食若乳母停

食所傷致兒吐瀉等病當治其母大抵始病而熱者邪

氣勝則實也終變為寒者真氣奪則虛也久病而熱者

內真寒而外假熱也久瀉元氣虛寒當參前證治之

黃芩湯 治下利而頭痛胸滿口若咽乾或往來寒熱

而嘔其脉浮大而弦者或協熱而利者 黃芩一兩芍藥

甘草

炙各一兩

右剉散每服三錢棗子一箇水一盞煎七分去滓溫

服嘔者加半夏一兩二錢半生薑煎

張渙清胃散

治挾熱泄利

川楝子

黃檗

微焙

當

歸

洗焙乾

地榆

炙

黃連

去鬚炙各半兩

右件搗羅為細末每服一錢水八分煎至四分去滓

溫服乳食前

香連丸

黃連

薑汁拌炒二兩

木香

煨半兩

右為末陳米飯丸菜豆大米飲下一二十九亦可調

六一散

傷食瀉湯氏云凡此瀉不宜便補先用消食藥或用紫

蘇丸

變蒸熱

取其積盡然後可補經云食瀉重當取疳虛

用補虛治食瀉與香橘餅子加減觀音散調中湯以

意加減凡傷食瀉難止亦不宜補再傷又瀉宜節飲食

當用進食丸

痞

取下食積令盡次以錢氏加減益黃散

只一服可止此乃切要治法然後異功散四君子湯

俱吐

瀉

調理必取全安有腹中雷鳴下痢者生薑瀉心湯主

之如冷積釀瀉用香朴散止之白水散以和氣調胃調

中散保安丸能止傷食瀉感應丸沉香煎三稜丸

癖積

皆可服也

東垣云傷食則惡食小兒食瀉者因飲食

傷脾脾氣不能健運故乳食不化而出若噯臭吞酸胸
膈脹滿腹痛按之益痛者雖作瀉而所停滯之物尚未
消也用保和丸腹痛按之不痛者乳食已消也用異功
散脾氣傷而未復不思飲食者用六君子湯所傷生冷
之物及喜熱者並加木香乾薑乳食已消腹痛已止瀉
尚未止者脾失升清之氣也用補中益氣湯餘有別證

當參各門 錢黃承務子二歲病傷食而瀉衆醫與止
之十餘日便青白乳食不消身涼加哽氣昏睡咸謂困
篤召錢錢先與益黃散補脾散各三服三日身溫而不
哽氣後以白餅子微下之又與益脾散三服利止何以
然利本脾虛傷食初不與下之留連十日上實下虛脾
氣弱則引肺亦虛脾肺子母故也今先補脾則肺病自
退即身溫不哽氣也然後下其所傷或曰何不先下後
補曰便青為下臟冷若先下必大虛今先實脾而後下

則不虛矣後更與補之乃安

香橘餅

止積瀉傷冷

木香

青皮

各一錢

陳皮

二錢半

厚朴

薑汁製

神麴

麥蘖

各半兩

右為末蜜丸為餅紫蘇米飲調下

加減觀音散

止吐瀉截虛風

黃耆

人參

各二錢五分

木香

甘草

炙

石蓮

去心

扁豆

炒

茯苓

白朮

全

蝎

羌活

各一錢

防風

天麻

各二錢

右剉散薑棗煎

調中散 治傷食瀉凡此瀉不宜便補先用食藥或紫

霜丸取其積盡然後可補經云食瀉重當取痞虛用

補虛良醫明妙理何慮疾難除 人參去芦 白茯苓

白朮 木香 乾薑炮 藿香葉 香附子炒去毛 縮

砂仁 甘草炙 丁香各等分

右為末每服一錢薑棗湯調下肚痛白湯下量大小

加減

生薑瀉心湯 治傷寒汗出解後胃中不和心下痞硬

脇下有水氣腹中雷鳴下利者 黃芩 甘草 炙人

參

各一兩半

乾薑

炮

黃連

各半兩

半夏

一兩一錢湯泡

右剉散每服三錢水一盞生薑三片棗一枚煎七分

去滓溫服

保安丸

治小兒

瀉傷食瀉

香附子

淨

砂仁

各一兩

白薑

炮

青皮

去穢

陳皮

去白

三

炮

義末

炮

甘草

炙各半兩

右為末麥蘖麴糊丸萊豆大每服三丸白湯下食前

溫服

杏霜丸

治小兒食積作瀉并痢證

杏仁

三兩去皮
尖麩炒

巴豆

一兩去殼油炒焦
却入杏仁同炒

黃蠟

二兩酒
煮綿濾

百草霜

炒為
末二

兩用油六

錢炒勻

右將杏仁巴豆研極細却入草霜令勻鎔蠟和丸如
菴豆大赤痢甘草湯白痢生薑湯先進三四服腹脹
者十餘服効驗如神

醫局開胃丸

治小兒府藏怯弱內受風冷腹脇脹滿

腸鳴泄利或青或白乳食不化又治藏冷夜啼胎寒

腹痛 木香 蓬莪茂 白朮 人參去芦頭 當歸劉

炒各半兩 麝香細研 白芍藥各一分

右件搗羅為末都研令勻湯浸炊餅和丸如黍米大
每服十五丸溫米飲下新生兒腹痛夜啼可服五丸
竝乳食前服

水瀉聖惠厚朴散 治小兒脾胃不和洞瀉下利不止

羸瘦食少 厚朴去麤皮塗生薑汁炙令香熟 人參去芦頭 訶梨勒

煨用皮 白朮 黃連去鬚微炒 地榆微炙劉 甘草炙微赤劉 乾

薑

炮裂剉
各半分

肉豆蔻

一枚
去殼

右件搗細羅為散每服以粥飲調下半錢日三四服

量兒大小以意加減

張渙厚朴散

治洞泄注下

厚朴

生薑
汁製

訶梨勒

炮取
皮

肉豆蔻

各一
兩

白朮

乾薑

炮各
半兩

右件搗羅為細末每服一錢水八分盞入生薑粟米

各少許煎五分去滓溫服

萬全龍骨丸

治小兒冷熱不調時有洞泄下利不止

龍骨

黃連

白石脂

白礬

燒令
汁尽

乾薑

炮

木香

各半
兩

右件藥搗羅為末醋煮麴糊為丸如麻子大每服以
粥飲下五九日三四服量兒大小加減服之

劉氏小兒水瀉注下

黃連

石蓮

各等分
炒黃色

右為末每服半錢水瀉新汲水調下白瀉粟米飲下
積瀉香橘餅 治嬰孩過傷乳食或吐或瀉及病後虛

中感積成痢氣弱神昏面黃目慢 南木香 陳橘

皮

去白

青皮

去白各二錢半

厚朴

去麁皮薑汁製七錢

縮砂仁

神麴

濕紙裹炮

麥芽

淨洗焙乾各五錢

三稜

炮剉三錢

右木香不過火餘七味剉焙仍同木香研為細末煉蜜作餅子如芡實大每服一餅至三餅用棗湯化開空心溫投米清湯亦可

驚瀉仲陽云慢驚病後或吐瀉胃虛或氣弱因驚眼白如淡墨下糞青黃此瀉合溫補至聖保命丹釣藤飲夜啼主之或乳隨糞下消乳九吐進食九痞主之或微渴

心脾喘燥狂熱此瀉尤難治辰砂五苓散驚主之冷者

定命飲子治之後與溫驚朱君散睡驚太乙丹 薛小

兒驚瀉者肝主驚肝木也盛則必傳尅於脾脾土既衰則乳食不化水道不調故泄瀉色青或兼發搐者蓋青乃肝之色搐乃肝之證也亦有因乳母脾虛受驚及怒動肝火而致者經曰怒則氣逆甚則嘔血及殮泄法當平肝補脾慎勿用峻攻之藥脾氣益虛肝邪彌甚甚至抽搐反張者亦肝火熾盛中州虧損之變證也凡見驚

證即宜用四君六君異功散等方加白附子定風柴胡
平肝引經以杜漸則必不至瀉搗而自安矣今已見瀉
吐驚搐尚不知補脾平肝以保命抱龍鎮驚等藥治之
其亦去生遠矣

至聖保命丹 治小兒胎驚內釣腹肚緊硬眠睡不安

夜多啼哭及治急慢驚風眼目上視手足抽掣不省

人事悉皆主之冷證用此 全蝎十四箇 去毒 防風 僵

蠶

炒去絲嘴

南星

炮

天麻

各二錢

白附子

麝香

五分

金箔

十片 蟬蛻 洗

朱砂 各一錢

有熱證加牛黃腦子礱砂

右為末粳米糊丸每兩作四十九常服鎮心安神化痰除一切驚風諸證湯臨時換一方加入參白茯苓二錢

定命飲子

治慢驚吐瀉困重欲傳慢脾通用 半夏

生揀圓白者

茯苓 木香 老生薑

切片乾各二錢

白朮 甘

草

炙各一錢

天麻

二錢半

右劉散每服二錢薑棗湯調下

朱君散 治吐瀉後有此證并糞青者宜服之 人參

白朮 茯苓 甘草 辰砂 麝香 燈心

鈎藤

右為末每服一錢用白湯調下

睡驚太乙丹 常服安神鎮驚止夜啼糞青 桔梗

一兩

炒 藿香葉 白扁豆 炒各半兩 白芷 三錢半 川芎 二錢半

右為末煉蜜丸如茨實大辰砂麝香為衣每服半丸
薄荷湯磨下正糞色棗湯下夜啼燈心鈎藤湯磨下

加白朮茯苓白芍藥尤妙

四神丸 治脾虛胃弱大便不實飲食不思或泄痢腹

痛 肉豆蔻

五味子

各二兩

補骨脂

四兩

吳茱萸

一兩

右為細末用紅棗六十五枚生薑六兩用水二鍾煮乾取棗肉和丸如桐子大每服五六十丸白湯送下或化服

二神丸

補骨脂

四兩

肉豆蔻

二兩

生用

右為末用紅棗四十九枚生薑四兩用水一鍾煮乾

取棗肉和丸如桐子大每服二三十九丸白滾湯下

疳積釀瀉沒石子丸 治久患疳痢及釀瀉 沒石二枚

南木香

濕帶包畧煨

淨黃連

剉碎薑汁炒各二錢半

肉豆蔻

二枚炮

訶子

四枚去核

右剉焙成末如烏犀丸內製飯糊為丸粟米大每服
十丸至三十丸或五十丸溫白湯空心下或米清湯
下

暴瀉巢氏小兒卒利者由腸胃虛暴為冷熱之氣所傷

而為卒利熱則色黃赤冷則色青白若冷熱相交則變為赤白滯利也

聖惠胡黃連散 治小兒冷熱氣不和忽暴下利腹內

疼痛 胡黃連 母丁香 桂心 木香 肉豆蔻

去殼當歸劉微炒

麝香 細研各一分

犀角 屑半分

右件藥搗細羅為散每服以粥飲調下半錢日三四

服量兒大小加減

龍骨散 治小兒暴利 龍骨 黃連 去鬚微炒 當歸

劉微炒

枳殼

麩炒微黃去
瓤各半兩

右件藥搗麤羅為散每服一錢以水一小盞煎至五
分去滓不計時候量兒大小加減溫服

張渙阿膠丹

治泄利身熱及暴瀉注下

真阿膠

炙熟

乾薑

各一兩

芍藥

當歸

洗焙乾

川黃連

肉豆蔻

各半兩

兩

右件搗羅為細末煉蜜和丸如黍米大每服十粒粟
米飲下量兒大小加減

神仙玉粉丹 補一切虛不熱男婦小兒皆可服冷積

暴瀉見功尤速

精明舶上硫黃

一斤去砂
石盡打碎

右將殭豬肚七箇旋採桑根白皮三斤寸剉將豬肚一箇淨洗以硫黃實之用麻線縫合水二斗先將桑根白皮一斤同煮一伏時其餘諸肚亦用慢火養之不得令冷候煮滿一伏時別以豬肚換之又用白皮內一斤同煮再一伏時又換豬肚并桑白皮過三伏時不換白皮只換豬肚其煮七伏時水耗以熱湯添

不得用冷水候滿七伏時取出用溫水淘淨研至細
候烈日中曬極熱再研煮糯米粉為糊丸如梧桐子
大每服空心米飲下十粒至十五粒大率驅除宿冷
其功效無比老人經久可服

久瀉大法補虛 消積 鳳髓經歌云脾中有積熱遲
留至使終年瀉不休項軟見人多哽氣更兼清水鼻中
流少間有似黃金色若有垂腸更不收形證又着胸膈
上胸前深赤汗如油唇赤生瘡眼脉赤若不調脾命即

休

千金七味散 治利下久不差 黃連八分 龍骨 赤石

脂 厚朴 烏梅肉各三分 甘草炙二分 阿膠炙三分

右治下痢漿水服二方寸七日二小兒一錢七

華陀治老小下利柴立不能食入口即出命在旦夕久

利神驗方 黃連末 亂髮灰 醇苦酒 密各半雞子殼許

白蠟方寸七 雞子黃一枚

右六味於銅器中炭火上先內酒蜜蠟雞子黃攪勻

乃內黃連末髮灰又攪煎視可取出為丸久困者一日一夜盡之

外臺療久利無間冷熱疳痢悉主之

棗一枚去核勿令皮破內胡粉令滿於炭火中燒如炭甕器中研之米飲和服一歲以下分服之不過三服差

聖惠治久利赤白漸羸胃虛不食丁香散 丁香 厚

朴

去麤皮塗生薑汁炙令香熟

黃連

去鬚剉微炒

當歸

剉微炒

訶梨勒

煨用皮

白朮

剉微炒

伏龍肝

各半兩

木香

一分

赤石脂

一兩

右件藥搗細羅為散每服以粥飲調下半錢日三四服量兒大小加減

聖惠黃連丸 治小兒曩利經久不斷增減有時黃

連

去鬚微炒

人參

去芦頭

赤石脂

龍骨

甘草

炙微赤剉

黃

芩

厚朴

去麤皮塗生薑汁炙令香熟

白茯苓

枳殼

去瓢微炒黃

各半兩

烏梅肉

一分微炒

右件藥搗羅為末煉蜜和丸如麻子大每服以粥飲

下七九日三四服量兒大小臨時加減

譚氏斗門散 歌曰小兒瀉利甚青黃久患時多轉滑

腸下部脫肚頻努嚙朝朝焦瘦漸羸疳 訶子 枳

殼 地榆

各等分

右為末每服一錢米飲調下一歲以下半錢

嬰孺龍骨湯 治下利不住 龍骨 甘草 黃連

各四分

分 當歸 乾薑

各一分

右以水四升煮取一升二合食前溫分三服

龍骨湯

治服藥下後不止

龍骨

五分

甘草

炙

乾薑

當歸

黃連

赤石脂

附子

炮製去皮臍

前胡

各三

分

右以水四升煮取一升二合為五服旦服至午令盡
黃連煎 治冷熱利經時不止體羸不堪餘治差而又
發用好黃連二兩水七升蜜八合煎一升三合去滓
百日兒服半合二百日一歲服一合

雞骨丸

治下利經久不斷羸瘦脾胃冷弱食不消化

雞骨

宿雌雞胸前及助骨全用一具

黃連

六分

厚朴

三分

神麴

炒

甘

草炙白朮

各四分

麥蘖

炒

烏梅肉

各二分

人參

赤石

脂黃芩

白龍骨

各五分

桔梗

二分

右為末蜜丸小豆大白飲下二十五丸日二服量兒

大小與之

溫白丸 治久瀉脾虛不食食即瀉下米穀不化 白

朮

一分米泔浸切焙

丁香

半錢炒

半夏

一錢半湯炮洗七遍

右為末生薑自然汁煮麴糊為丸如梧桐子大半歲

每服三九三五歲五七九淡生薑湯吞下早晚各進
一服

惺惺散 治久瀉脾困不思乳食恐作脾風 天麻

全蝎

炒各半錢

木香

炮

糯米

人參

茯苓

各微炒

白扁

豆

炒

山藥

焙

甘草

炙各一錢

右為末每服嬰孺一字二三歲半錢用水一藥注或
半銀盞棗子半片煎十數沸服

張渙治瀉利久不差香礬丹 木香

枯白礬

各一兩

訶

梨勒皮

微炮

酸石榴皮

炒黑各半兩

右件搗羅為細末鍊蜜和丸如黍米大每服十粒粥飲下量兒大小加減

劉氏治小兒臟腑久泄瀉不止 人參 白朮 茯苓

甘草 陳皮 藿香 丁香 木香 肉豆蔻

右等分為末每服二錢以藿香合糯米煮粥飲調下或薑水煎亦可

臟腑滑泄四君子加訶子五分米飲調下

飧瀉

醫書謂之水穀瀉

錢食不消脾胃冷故不能消化當補脾

益黃散主之

潔乳食不消初病忽然氣出冷四肢亦

冷面白無光澤精神不定此乃胃氣不和可以大溫藥

治之史君子九益黃散主之

若病泄瀉日久不瘥乳

食不化是脾胃有風冷先服益黃散二服後用宣風散

導之胃宜再補

宜參大科飧泄門用之

聖惠厚朴散

治小兒水穀利羸瘦面黃不欲飲食

厚朴

去麤皮塗生薑汁炙令香熟

龍骨

黃連

去鬚微炒各半兩

丁香

當歸

劉微炒

木香

白朮

肉豆蔻

各一分

右件藥搗細羅為散每服以粥飲調下半錢日三四

服量兒大小加減

地榆散

治水穀利日夜不止

地榆

劉微炙

厚朴

去麁皮塗

生薑汁炙令香熟各三分

黃連

一兩去鬚微炒

阿膠

半兩搗碎炒令黃色

右件藥搗細羅為散不計時候以粥飲調下半錢量

大小加減

醫局胃風湯

治風冷乘虛入客腸胃水穀不化泄瀉

注下腹脇滿腸鳴疔痛及腸胃濕毒下如豆汁或下
瘀血日夜無度並宜服之 人參去頭 白茯苓去皮

窮

桂皮

去麤皮

當歸

去苗

白芍藥

白朮

各等分

右為麤散每服二錢以水一大盞入粟米百粒同煎
七分去滓稍熱服空心食前小兒量減

小兒大便青澀瀉脉大手足寒難已脉小手足溫易
已

赤白痢

湯氏云小兒痢疾皆因飲食無節或餐果食肉不知厭足乃脾胃尚弱不能尅化停積於臟故成痢也熱搏則赤風寒之氣入於腸胃致令津液凝滯則成白痢或夾青者有驚積或如魚腦肚中疼甚者大抵八痢但冷熱赤白藥性雖有不同治法不相遠矣又有赤白相雜者當先去其熱積須用大黃枳實朴硝之類以去其熱毒然後黃連黃芩黃蘗解其熱痢此止疼自定此妙法也如痢不止則用地榆熟艾等劑調理自然平復脾虛者

不可輕用罌粟澀滯等劑必致危困須用沒石子黃連
阿膠地榆以止之方為盡善其枳殼芍藥皆要藥也噤
口痢不能食者石蓮散主之香朮散亦可冷痢如豆汁
肚疼者胃風湯主之脾毒痢臟熱當服香連丸黃連香
薷散去桂五苓散驚茅花湯當歸芍藥枳殼地榆川芎
等劑先與解毒退熱却與開胃進食分利水穀寬腸定
痛先與水浸丹局方敗毒散痘初熱地榆飲寬腸枳殼散
有熱而痢不止者三黃熟艾湯主之積滯不通者神芎

九亦可用熱甚煩躁者黃連解毒湯解之

煩躁

發火散

亦効 曾赤白之痢世人莫不曰赤為陽為熱白為陰為冷或曰無積不成痢至於調治若以冷熱之劑互進或投去積之藥必難取效不究其原何由可療且四時八風之中人五運六氣之相勝夏秋人多痢疾內經曰春傷於風夏生飧泄至真要大論曰少陽在泉火淫所勝民病注泄赤白其可拘於無積不成痢之說若專以積為論豈一歲之中獨於夏秋人皆有積春冬不然蓋

風邪入胃未能勝土不為暴下則成痢疾赤白交雜此
為陰陽不分法當分正陰陽五苓散以導其逆理中湯
以溫其胃使色歸一然後施治若一分之後仍赤白同
下則當究其所患之因若先白後赤乃內傷生冷失於
蓋覆由元氣感於暑熱治法先救其裏次解暑毒若先
赤後白乃先傷熱而後失蓋感冷先宜解熱後治其痢
有夾熱而痢者則下純鮮血此風能動血宜冷服黃
連香薷散

吐瀉

川草散及當歸散

潮熱

加醋炒蒸栢葉

水薑煎服或羗法散加三和湯水薑倉米煎 有夾冷而痢者則下純白凍或白上有粉紅色或似豬肝瘀血皆為陰證蓋血得寒則凝澀故也先用呔咀五苓散加守中湯瀉煎投次以附子理中湯帶涼服或固真湯慢

驚倘不辨其虛實冷熱妄行施治必致脾胃愈虛不能乳食成噤口痢者則難療矣又有裏急後重蓋裏急為陽後重為陰未圓前腹痛為裏急已圓後腹痛為後重故裏急者大腸澀也先以大順飲加寬氣飲急驚和解

及菴活散水薑倉米煎服次下寬腸丸後重為氣虛用
呖咀五苓散加入參水薑煎服併投香連丸若二證俱
作前二丸子並進或雙金飲金粟丸亦佳然瀉痢二字
自是兩證糞夾水來多而順者曰瀉帶血凍白凍來三
五點而痛者曰痢輕重陰陽於此而分斯為治法有膿
血交雜經久不止晝輕夜重或晝夜頻數食減痛多並
用萬金散神効散主之有五色痢下者乃因五臟蘊熱
日久不散故有是證蓋五臟受熱榮衛不調五穀不化

熏腐臟腑神氣昏沉此候已危最苦是腹中刺痛兒小者無治法蓋五色者乃五臟之色皆見於外兒大者可用局方三神丸或小來復丹以五苓散送下或者可療若投藥如故不可為也 又有風痢多是黃褐色與疳瀉頗同但不臭為異耳此風毒停滯於脾宜去脾經風毒瀉黃散主之若見赤白同下久而不禁小便少澀痛熱並作唇裂眼赤氣促心煩坐卧不安狂渴飲水穀道傾陷時復面容如粧飲食不進者難治 薛錢仲陽云

瀉痢黃赤黑皆熱也瀉痢青白米穀不化皆冷也東垣云白者濕熱傷於氣分赤者濕熱傷於血分赤白相雜氣血俱傷也海藏用四君芍歸治虛弱之痢四君乾薑治虛寒之痢愚嘗治手足指熱飲冷者為實熱用香連丸手足指冷飲熱者為虛寒用異功散送香連丸若兼體重肢痛濕熱傷脾也用升陽益胃湯小便不利陰陽不分也用五苓散若濕熱退而久痢不愈者脾氣下陷也用補中益氣湯倍加升麻柴胡瀉痢兼嘔或腹中作

痛者脾胃虛寒也用異功散加炮薑木香或變而為瘧者肝尅脾也用六君升麻柴胡鈞藤鈎若積滯已去痢仍不止者脾氣虛也用六君子送下香連丸若因乳母膏粱厚味六淫七情致兒為患者當各推其因仍兼治其母并參冷熱瀉及積滯腹痛等證覽之

挾表證宜發表菴活散 治傷風時氣頭痛發熱身體

煩痰壅咳嗽失音鼻塞聲重及解時行下痢赤白

人參

去芦

菴活

赤茯苓

去皮

柴胡

去芦

前胡

去芦

川芎

獨活

桔梗

剉炒

枳殼

去瓢

麸炒

蒼朮

米泔水浸一宿去麁皮濾

乾剉片炒至微黃色

甘草

各一兩

右剉每服二錢水一盞薑二片薄荷三葉煎七分無

時溫服發散風邪入葱白同煎痢證薑倉米煎

有積宜下之湯治痢之法若欲取積只用官局進食丸

瘕甚穩雖取積又能治痢萬無一失積已下急以四君

子湯加豆蔻訶子補之次服厚腸香連丸得効

丹治小兒痢疾 黃連 黃芩 大黃 甘草

右煎服赤痢加紅花桃仁白痢加滑石末

治小兒赤白痢多體弱不堪下大困重者麻子一合炒令香熟為末每服一錢七蜜漿水和服効

水浸丹

治瀉痢先鋒之藥

黃丹

研細一兩

巴豆

大者二十箇

去皮膜研細出油或黃丹二兩半

右研勻用黃蠟半兩鎔作汁拌勻量大小旋丸水浸吞下湯使更臨病隨意用一方黃丹一兩巴豆四十粒乳香二錢麻油二錢蠟半兩鎔汁和丸名頓止

丹又冷證加木香二錢半

寬腸丸

治痢後裏急大腑閉澀不通

枳殼

水浸去穢剉片

麥麩炒微黃仍用清油浸透一兩焙乾五錢

麻仁

去殼

木通

去皮節

大黃

半生

半炮檳榔

大腹皮

淨洗焙乾各二錢半

右除麻仁用乳鉢極細杵外五味檳榔不過火餘焙同研成末入乳鉢中與麻仁再杵勻煉蜜丸菴豆大每服三十九至五十九仍以枳殼甘草煎湯空心送下一二歲嬰孩溫蜜湯下

熱利用涼藥海藏治赤痢用四君子加赤芍藥當歸入粟米少許同煎

黃連解毒湯 治時疾三日已汗解苦煩悶乾嘔口燥

呻吟錯乳不得卧亦治熱痢 黃連三錢黃檗半兩梔子

四箇黃芩一兩

右剉散每服三錢水一盞煎六分去滓服

瀉火散 治中暑煩躁發渴口乾及治血痢 青皮去白

赤芍藥 黃連去鬚地榆各等分

右為細末每服一錢冷水調下如搐熱而氣血妄行
加甘草

芍藥槩皮丸 治一切惡痢窘痛膿血 芍藥 黃槩

各一兩 當歸 黃連 各半兩

右為末滴水丸小豆大每服二三十九丸熟水下加枳殼

寬腸枳殼散 順氣止痢 甘草 六錢 枳殼 去穰炒二兩四錢

右為細末每服一錢空心沸湯點服

三黃熟艾湯 治積臟腑下痢赤白及治傷寒四五日

而大下熱痢服諸藥多不止宜服之 黃芩 黃連

黃檗

各七錢半

熟艾

半雞子大

右剉散每服三錢水一盞煎六分去滓溫服

地榆散

治瀉痢血痢

地榆

訶子

甘草

各等分

右為末鹽米湯調下有熱加黃芩

又方

地榆

訶子

厚朴

薑製各等分

右剉散每服二錢水一盞薑棗煎服

地榆飲

治冷熱痢腹痛下痢赤白頻併 地榆 甘

草 芍藥

枳殼

各二錢半

右剉散每服二錢白水煎加黃連炒

又方 地榆

烏梅

槩皮

甘草

當歸

各等分

右剉散每服二錢煎服

川草散

治腹痛下痢赤白不拘遠近

川芎

白芷

甘草

半生半炙各七錢

赤芍

當歸

酒洗

淨黃連

各五錢

右剉焙為末每服半錢至一錢白痢白薑湯調赤痢

甘草湯調赤白痢溫米清湯調並空心服

治熱痢備急方 用井花水調臘茶蜜磨生薑渴則飲之

本事治小兒赤痢 搗青藍汁二升分四服

聖惠方治小兒中蠱

血下

治小兒屎血

甘草

五分

以水六合煮取二合去渣一歲兒一日服令

盡

錢氏黃蘗丸

治小兒熱痢下血

黃蘗

去皮半兩

赤芍藥

錢四

右為末飯和丸如麻子大每服一二十丸食前米飲

下量兒加減

梔子丸

治小小熱痢不止

梔子

七枚

黃蘗

三分

黃連

五分

礬石

四分

大棗

四分

炙

令黑

右五味為末蜜丸如小豆大服五丸日三夜二服不

知稍加至十丸

外臺子芩湯

療小兒熱痢

子芩

十二分

知母

女萎

各六分 竹葉

切八分

黃蘗

甘草

各四分

右六味切以水二升煮取一升分服甚妙

聖惠梔子仁散

治小兒熱痢腹痛心煩口乾小便赤

黃不思飲食

梔子仁

當歸

各半兩

黃蘗

地榆

微炙對各三分

黃連

一兩去鬚微炒

右件藥搗細羅為散每服以粥飲調下半錢日三四

服量兒大小加減

烏梅散

治小兒熱痢但壯熱多渴而痢不止 烏梅

二枚微炒去核

黃連

去鬚微炒

藍葉

各一分

犀角

屑

阿膠

搗碎炒令黃燥

甘草

炙微赤剉各半兩

右件藥搗麤羅為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓放溫不計時候量兒大小分減服之

疳證治赤痢開胃散

白朮

茯苓

人參

各半錢

石蓮

子

去皮殼心十箇

右為末藿香湯下半錢

孔氏治赤白痢骨立地榆一斤水三升煮升半去滓煎

如錫空腹服

黃連例

錢氏法

加黃檗為二聖丸

治痢

加橘皮為橘連

丸

治痢

加榆仁為榆連丸

治痢

加黃芩大黃為三黃丸

熱

治積

加阿膠茯苓為阿膠丸

治痢

加訶子木香為小

香連丸

治痢

加豆蔻木香為豆蔻香連丸

治瀉

加木香

白附子為白附子香連丸

治痢

加阿膠當歸乾薑為駐

車丸

治痢

冷痢用溫熱藥海藏治白痢用四君子等分加乾薑減

半入粟米少許同煎

大順飲

吐見

養臟湯

主生津益氣溫腸止痢

人參

去芦

甘草

炙各二錢

半

白芍藥

白朮

各半兩

南木香

肉桂

去麋皮各一錢

肉

豆蔻

罌粟殼

去蒂剉蜜水炒

訶子肉

各一錢半

右件㕮咀每服二錢水一盞薑二片棗一枚煎七分

空心溫服或入倉米同煎

廣濟療客冷白痢

人參

六分

厚朴

炙

甘草

炙各四分

茯苓

桔梗

各五分

梁州欖皮

各八分

右六味切以水三升煮取一升量大小可一合為度

以瘥止忌如常法

嬰孺治五六歲兒冷痢 當歸 黃連 龍骨

各四分

赤

石脂

厚朴

炙

乾薑

酸石榴皮

各二分

右切以水三升半煮取一升六合為四服相去一炊

久服

雄朱散 治小兒腸胃虛冷下痢頻併日夜疼痛不可

忍

雄黃

一分細研
水飛過

乳香

細研

白礬

煨各
一錢

右為末每服嬰孩一字二三歲半錢陳米飲調下一

日三服

玉脂散

治冷痢大便色青甚則有膿

白石脂

當

歸

洗焙
乾

丁香

白朮

炮各
一兩

草豆蔻

去
皮

厚朴

生薑汁
製各半

兩

右件搗羅為細末每服半錢以粥飲調下量兒大小

加減

治白痢艾湯

艾葉

微炒

當歸

各一兩

乾薑

炮

木香

訶梨

勒皮

炮各半兩

右件搗羅為細末每服一錢水八分一盞入粟米少

許煎至五分去滓溫服食前

養臟湯

治白痢頻併

當歸

洗焙乾

烏梅肉

炒乾

乾薑

黃耆

白朮

炮

龍骨

各一兩

右件搗羅為細末每服一錢水一小盞生薑粟米各少許煎至五分去滓溫服乳食前量大小加減

聖惠治秋深冷痢不止灸臍下二三寸動脉中三壯炷
如麥

寒熱雜合香連丸 治赤白下痢煩渴作痛 南木香

半兩不
過火 淨黃連 一兩剉用茱萸
炒 仍去茱萸 烏梅肉 二錢半薄
切用屋瓦

慢火
焙乾

右為末用阿膠半兩剉碎炒脹水化為糊候冷入乳
鉢內同前藥末亭分杵勻丸作麻仁大赤痢每服三
十三丸至五十五丸或七十七丸甘草湯空心下白

痢丸數同前白薑湯空心下赤白交作溫米清湯空心
燕服

金粟丸 治下痢赤白水穀不化 淨黃連一兩 川芎

枳殼製 穀芽淨洗 赤茯苓去皮 白芷 南木香各半兩

神麴一兩別研
為末作糊

右除木香別剉不過火餘六味焙入木香同為末用
神麴末煮糊丸粟穀大每服七十丸至百丸空心溫
米清湯下或不拘時

白附香連丸

治腸胃氣暴傷乳哺冷熱相雜渴痢赤

白裏急後重腹痛扭撮晝夜頻併乳食減少 黃連

木香

錢各一

白附尖

錢二箇

右末飯丸如粟米大每服十丸至二三十九米飲下
食前日夜各四五服

荳蔻香連丸

治泄痢不拘寒熱赤白陰陽不調腹痛

腸鳴切痛立効如神

黃連

炒三分

肉豆蔻

木香

各一錢

右為細末粟米飯丸米粒大每服十九至二十九
日夜各四服食前米飲下

木香丸

治小兒泄瀉青白膿血相雜

黃連

吳茱萸同炒去

茱萸一兩

肉豆蔻

煨二箇

木香

一錢

右為細末麩糊丸如黍米大赤痢粟米飲下白痢厚
朴湯下空心服

小香連丸

治冷熱腹痛水穀利腸滑

木香

訶子

肉

各一分

黃連

半兩

右為細末米飲和丸如菜豆大每服十九至三五十丸食前頻服之

吉氏香連丸 治赤白痢 黃連 木香 訶子皮

各一

兩肉豆蔻

二箇子苓

半兩

右末蜜丸菜豆大空心煎醋漿湯下大人十九小兒五丸空心日午再服煎薑蜜湯下

白膿痢嬰童寶鑑論小兒腸寒即下白膿腹痛

顱顱經治孩子冷毒疳痢白膿疳疔日加瘦弱不喫食

腹痛

青木香

一分黃連

兩半

右末以蜜丸如梧子大一歲以上空心熟水下一丸
三歲五歲服二丸藥性熱不宜多服忌生冷聖惠叔
治冷熱痢二物等分

葛氏肘後雞子餅 療小兒秋夏暴冷痢腹脹乍寒乍
熱白帶下

右用雞子一枚胡粉一丸碎絹篩合雞子黃白共搗
研調熬令熟如常雞子餅兒年一歲一食半餅日再

不過二餅即差兒大倍作凡羸弱不堪與藥宜與此餅

王氏手集治大人小兒純膿白痢其効如神脂附丸

大附子一

枚

右先用豬膏搗成油半盞許蘸前件附子令裂澇出放冷削去皮臍碾為細末以棗肉和丸大人如梧子大小兒如菴豆大每服五七丸至十五二十丸米飲湯送下空心食前服

朱氏家傳治小兒白膿冷痢臍下絞痛 訶子皮 青

木香

各等分

右件並為末以粳米飯丸如菰豆大米飲下五丸

長沙醫者丁時發傳附子散 治小兒疳痢多有白膿

腹內疔痛

附子

炮去皮尖一枚

龍骨

赤石脂

各半兩

蜜佗

僧 黃丹

胡粉

炒

烏賊魚骨

燒

赤芍藥

各一分

右件為末每服半錢米飲下一日三服

純血痢巢氏云小兒痢如膏血者此是赤痢腸虛極腸

間脂與血俱下故也 聖惠夫小兒血痢者由熱毒折
於血血入大腸故也血隨氣循環經絡通行臟腑常無
停滯若為毒熱所乘遇腸虛血滲入於腸則成血痢也
寶鑑小兒腸熱即痢下鮮血一如腸風

外臺廣濟療小兒熱毒血痢方

犀角

十分地榆

六分蜜

三分

地麥草

五合

右四味切以水三升煮取二升去滓量大小服之

又方 葱白

三兩

香豉

三合

梔子

綿裹

七枚

黃連

一兩

右四味切以水二升煮取九合去滓分服

外臺劉氏療小兒血痢方 地榆 黃檗 黃連 黃

芩

各六分

馬藺子

二分

茜根

一斤

生薑

三分

右七味切以水二升煮取一升分服大小量之與一合至二合為度

陳藏器小兒寒熱丹毒中惡注忤痢血方

右竝煮草犀根汁服之更良生水者名水犀也

食醫心鑑治小兒血痢方

右取生馬齒莧絞汁一合和蜜一匙七空心飲之

聖惠治小兒血痢煩熱口乾腹痛黃連散

黃連去鬚微炒

犀角

屑

白蘘荷根

黃芩

蔓青根

吳藍

各一兩

白頭翁

三分

甘草

炙微赤剉

當歸

剉微炒各半兩

右件藥搗麤羅為散每服一錢水一小盞煎至五分去滓不計時候量兒大小分減服之

聖惠治小兒血痢不差馬齒菜汁粥方

馬齒菜汁一合

蜜

半合

粟米

一合

右以水一大盞煮作粥後入二味和調食前服之

張渙水蓼丹

治血痢疳瘦

蛇蛻皮

燒灰

雞頭殼

燒灰存性

各一兩

胡黃連

水蓼

各半兩已上各搗羅為細末次用

朱砂

半兩真

蘆薈 牛黃

粉霜

各細研一分

右件都拌勻再研細軟飯和如黍米大每服五粒至七粒麝香湯下量兒大小加減不拘時候

張渙治熱乘於血滲入腸胃其病則赤黃連丹方 黃

連

去鬚二兩

當歸

洗焙乾一兩

白頭翁

蔓青根

湯洗焙乾各三兩

木香

川棟子

麩裏炮
各半兩

右件搗羅為細末粳米飯和丸黍米大每服十粒米
飲下量兒大小加減

張渙茜根湯

治血痢不差

茜根

剉

地榆

剉

黃連

去
鬚

赤石脂

阿膠

炙熟各
一兩

甘草

炙

黃檗

各半
兩

右件藥搗羅為細末每服一錢水八分煎至五分去

滓放溫服

張渙厚腸丸

治血痢腸虛

黃連

去
鬚

川棟子

各一
兩

木

香

阿膠

炙

吳茱萸

微炒

當歸

洗焙乾

各半兩

右件搗羅為細末粟米飯和丸黍米大每服十粒米飲下乳食前量兒大小加減

張渙聖効散

治血痢久不差

赤石脂

燒赤

白龍骨

阿膠

炙各一兩

訶梨勒皮

木香

乾薑

炮

黃連

甘

草

炙各半兩

右件搗羅為細末每服半錢煎粟米飲調下食前

張渙必効散

治血痢頻併

川黃連

去鬚二兩

大棗

半升

乾

薑一兩 白礬半兩

右件用瓦器盛鹽泥固濟留一竅予以木炭火燒煙
息為度取出搗羅為末白麪糊和丸黍米大每服十
粒米飲下量兒大小加減

錢乙附方

治小兒熱痢下血

黃蘗

去皮半兩

赤芍藥

四錢

右同為細末飯和丸麻子大每服一二十粒食前米
飲送下大者加丸數

吉氏家傳治小兒血痢方

右用宣連為末以雞子攪作餅子炭火煨令通赤便
蓋着勿令泄氣候冷細研空心米飲下半錢大人一
錢以意加減服

又方 右只用熟水調下好鬱金末半錢

吉氏家傳地榆散 治小兒血痢日久不差 地榆一分

炒訶子五箇炮 陳槐 黃連各一錢炒

去皮

右為細末每服半錢或一錢陳米飲下

膿血相雜痢聖惠夫小兒膿血痢者由熱毒在藏血得

熱則流溢滲入大腸與腸間津液相搏積熱蘊結血化為膿腹虛則泄故成膿血痢也

葛氏肘後小兒毒下及赤滯下如魚腦白頭翁丸方

白頭翁

三分

黃連

六分研

石榴皮

三分有毒除石榴皮用犀角屑三分

右三物以水二升煮取八合兒生四十日以五合為

三服大者則加藥

肘後乳母方 扁豆莖

一升炙令乾乃切之

人參

三兩

右以水三升煎取一大升半去滓取汁煮粟米粥與

乳母食之良常徧蓋覆乳勿冷佳又法乳母常食粥
仍欲乳兒先捻去少許即當佳

肘後近效方 療小兒三歲即患痢初患膿少血多四
日膿多血少日夜四十餘行朱子丸方服即效 生

地黄

汁五
小合

羊腎脂

一小
合

右先溫腎脂令煖分三四服立効乳母須禁食并有
乳母方在前

千金黃蘗湯

治小兒夏月傷暑寒寒折大熱熱入胃

下赤白帶如魚腦壯熱頭痛身熱手足煩此太陽之
氣外傷於寒使熱氣便入胃也服此方良若悞以利
藥下之或以溫脾湯下之則熱劇以利藥下之便數
去赤汁如爛肉者或下之不差後以澀熱藥斷之下
既不止倍增壯熱者服之即効或是溫病熱盛復遇
暴寒折之熱入腹中下血如魚腦者服之良 黃蘗

黃連

白頭翁

一作白欬

升麻

當歸

牡蠣

石榴

皮

黃芩

寄生

甘草

炙各二分

犀角

艾葉

各一分

右十二味呔咀以水三升煮取一升二合百口兒至二百日一服三合二百餘日至暮歲一服三合半

千金治小兒赤白滯下雜方 薤白一把豉一升以水

三升煮取二升分三服 栝葉麻子末各一升以水

五升煮三沸百日兒每服三合 亂髮灰鹿角灰等

分三歲兒以水和服三錢七日三 牛角鰓灰水和

服三方寸七 搗石榴汁服之 燒蜂房灰水和服

之 生地黃汁白蘘荷根汁各五合微火上煎 單

服生地黃汁一合

聖惠吳藍散 治小兒膿血痢如魚腦腹痛 吳藍

川升麻 赤芍藥 龍骨 梔子仁

各一兩半

右件藥搗麝羅為散每服一錢水一小盞入豉三七粒煎至五分去滓不計時候量兒大小分減溫服

樗根皮散 治小兒膿血痢如魚腦困重 臭樗根皮

一分剉 枳殼 去瓤 黃連 去鬚 蕪荑 微炒 赤芍藥 各半

兩

右件藥搗麤羅為散每服一錢以水一小盞入豉三十粒葱白一莖煎至六分去滓不計時候量兒大小分減溫服

人參散 治小兒膿血痢多時不差腹痛羸瘦不欲飲

食

人參

去芦頭

當歸

剉微炒

地榆

剉微炙

阿膠

搗碎炒

黃

連

去鬚微炒

子芩

黃芩

剉微炙

赤芍藥

蕪荑

微炒

厚朴

去麤皮塗生薑汁

炙令香熟各半兩

右件藥搗麤羅為散每服一錢以水一小盞入薤白

一莖豉五十粒煎至五分去滓不許時候量兒大小
分減溫服

雞屎礬丸 治小兒膿血痢不差漸加瘦弱 雞屎礬

燒

龍骨

阿膠

搗碎炒
令黃燥

黃連

去鬚微炒
各一兩

胡粉

一分
炒微

黃

右件藥搗羅為末煎醎醋為膏和丸如菉豆大每服
以煖漿水下七九日三四服量兒大小以意加減

養生必用黃連阿膠丸 治熱痢下重膿血疼痛腹中

痛不可忍老人產婦虛勞人小兒竝宜服 黃連去

一兩 白茯苓 白芍藥 阿膠杵碎慢火炒如珠子白
色別杵為細末各半兩

右上三物為細末斟酌米醋多少熬膠得所和勻入
白杵萬下衆手丸如棗豆大每服自二十九為始止
於五十丸食前溫米飲下日二三以知為度未知加
藥更丸一等如黃米大與小兒服

燔髮散 治腸澼下膿血 白石脂分一髮燒 甘草炙各
二分

右為末米汁和二刀圭日二服

張渙建胃丹

治泄利兼膿血日漸羸瘦黃連

一兩去鬚

微炒

白礬

一分枯令盡汁

烏梅肉

炒

龍骨

白石脂

神麴

炒

乾薑

各半兩

右件搗羅為細末醋煮麴糊和丸黍米大每服十粒

米飲下量兒大小加減

青橘丹

治冷熱相交赤白相雜膿血

青橘皮

湯浸去白

焙

當歸

湯洗焙

黃連

乾薑

各一兩

厚朴

生薑製

肉豆蔻

各半兩

兩

右件搗羅為細末白麪和丸黍米大每服十粒米飲下食前

長沙醫者王允傳通神丸 治小兒大人痢疾下膿血

裏急腰重臍腹疼痛 沒藥 五靈脂 乳香

各研細炒

一錢巴豆 七枚去皮心膜壓出油

右四味同研令細勻滴水為丸如粟米大每服一粒生木瓜研水下不拘時候

五色痢形證論歌曰五色之痢最末端見此方知有五

般青色只因驚積聚黃多食積在脾間白色冷虛腸胃
患赤為積熱最難安難肝隱積多成片黑血相和不易
安唇搐胸高兼露齒臉紅筋出每居前急安臟腑和湯
散醫者留心按古賢 又歌曰五色之痢莫言奇四歲
之前始有之青色只因驚積聚黃因食積毒於脾赤黑
已知心腎病白多殘害是脾為三七以前無變動休令
多睡飲餐遲 此疾且須和五臟補榮衛方漸漸安瘳
如目腫不進飲食

楊云是惡候

只與調胃散補之

漢東王先生鮓湯丸

治小兒瀉痢五色膿血如爛魚

腸竝無大便只是膿血腸中攪痛 粉霜 輕粉

硃砂

各一錢

白丁香

炒一錢七

乳香

半錢

巴豆

七粒去皮
心不出油

右為末蒸棗肉丸每服嬰孩三丸如粟米大二三歲
如大麻子大四五歲亦如麻子大竝旋劈成九煎鮮
湯吞下一日二服間調胃氣藥與之

三十六種內治下五色惡物心神煩熱不止方 地榆

白茯苓 黃蘗

炙各一兩

右為末每服一錢水一盞煎至五分去滓分三服

三霜丸

治小兒赤白或五色積痢

巴豆

去皮揀選白色肥好

者三錢研細先用白絹包三二十重次用白紙外面包定大石壓令油盡取二錢輕者為用

真

輕粉 粉霜

各二錢

右三味同研勻極細別取好黃蠟三錢酒煮三二十沸取出去酒令淨再鎔入藥和之如有取酒蠟亦堪用和成劑油單內盛如服食旋丸如小棗豆大三歲

以下如粟米大每服三五丸溫熟水下量兒大小加減

吉氏家傳治五色痢兼渴不止方 茯苓 宣黃連

黃檗

各等分

右件取黃檗末以漿水如麪糊良久和前二味為丸如菜豆大三歲米飲下七丸殺疳熟水下五丸

至聖丸 治五色痢 厚朴

去皮並製

黃檗

略去皮以雞子白炙黃熟如乾

再當歸酒

浸

右三味等分細末煉蜜為丸如梧桐子大小兒細丸
厚朴湯下每服四十丸加減

定粉散 治疳痢五色痢 定粉 龍骨 黃丹

煨過各二

錢
訶子

三箇煨熟取肉

右為末每服半錢粥飲下三歲以上半錢

噤口痢石蓮散 治小兒噤口痢噦逆不食止而復作

蓮肉

去心炒

右為末每一錢米飲調服 一方用山藥為末米飲

調下亦可

香脯散 治小兒刮腸下痢噤口不食閉眼合口至重

者 精豬肉

一兩薄批一片

膩粉

右將肉於炭火上慢炙旋鋪膩粉炙令成脯每以少許與喫如未知喫且放鼻間自然要喫此方治胃口有毒至奇至妙

丹小兒噤口痢釀乳法 厚朴 枳殼 各五分 白朮 芍

藥

各半兩

滑石

一兩

木通

陳皮

甘草

各五分

右分四貼細研桃仁七枚水二盞半煎取一盞與母服服時去宿乳令盡為妙

休息痢肘後治下痢經時不止者此成休息方

取龍骨炙令黃焦搗服方寸七日三服即愈 又方用龍骨四兩搗如小豆大水五升煮取二升半冷之分為五服效

保生信效松焙飲子 治一切塊癖積滯氣血痼聚等

一二十年者細墨

焙

芫花

醋浸炒
焦赤

青礞石

大戟

乾漆

炒

五靈脂

京三稜

蓬莪茂

蜜佗僧

陳橘皮

去白

牡蠣

燒各半兩

巴豆

一兩

去皮用濕紙

三處裏燒紙焦止

大乾

乾

束

十四箇去核燒存性

白丁香

硃砂

蟲蟲

去翅足

斑貓

各一

分

右同為細末醋煮麪糊丸如皂子大捏作餅子記以所傷物煎湯或麪湯送下一丸須以齒齧嚥之其積漸漸移近下再服再覺移下更一丸則積自下若尋常要宣轉只以麪湯下血積塊癖經血閉塞大人小

兒久痢膿血休息惡痢皆治之

玉命丹 治小兒久患赤白痢及休息痢不止腹肚虛

鳴日漸羸瘦擗眉多喫泥土可食者 硫黃研蜜陀

僧 黃丹各半寒水石 白礬各研二兩用新瓦餅子入五味用鹽

泥固濟煨令通赤研勻細麝香一字

右件六味研勻以蒸餅為丸如小菴豆大每服十粒
用烏梅甘草煎湯下大小加減忌生冷毒物鮓麪等
蟲痢巢氏病源小兒蠱毒痢後歲時寒暑不調而有毒

厲之氣小兒解脫為其所傷邪與血氣相搏入於腸胃
毒氣蘊積值大腸虛者則變痢血其痢狀血色蘊瘀如
雞鴨肝片隨痢下此是毒氣盛熱食於人藏狀如中蠱
故謂之蠱毒痢也 石壁經脾毒痢歌曰脾間有毒號
純陽本為醫人熱藥傷致使大腸多結澀多饒滴血在
枯腸如風腹閑難開眼身熱頭溫脚轉涼舌赤胸高為
此候多啼喘急更如吐先須解熱并開胃便是明醫用
藥良 此脾受熱積失治則伏毒治當涼脾次去其積

若胸前骨忽然高者更加喘急則不治也 鳳髓經歌

同有注云宜與金華散

實熱

香連丸

即吉氏香連丸見前條

形證論

風毒痢歌入痢之中風轉難形如青草汁多般毒風豆
汁添邪熱胃敗難肝片片全加赤不須先下積閉脾胃
絕不堪看若歸白痢還須下藏府頻溫得本源

千金治下血狀如雞肝腹中攪痛難忍號蠱毒痢方

茜根

升麻

犀角

各三兩

桔梗

黃檗

黃芩

各二兩

兩

地榆

白蘘荷

各四兩

右八味呖咀以水九升煮取二升半分三服此蠱痢
血用之小兒分減服

圖經治蠱痢方

側栢葉

焙乾
為末

川黃連

等分

右二味同煎為汁服之以療男子婦人小兒大腹下
黑血茶脚色或膿血如淀所謂蠱痢者治之有殊効
又能殺五臟蠱

子母祕錄小兒蠱毒痢方

右用生地黃汁一升二合分三四服立效

聖惠囊荷散 治小兒蠱毒痢不止身體壯熱煩悶

白囊荷根

川升麻

各一分

敗鼓皮

一分炙黃焦

甘草

炙微

赤劉乾藍葉

各半兩

赤芍藥

犀角屑

各三分

右件藥搗麤羅為散每服一錢以水一小盞入豉二

七粒煎至五分去滓不計時候量兒大小分減溫服

聖惠黃連散 治小兒蠱毒痢血體瘦

黃連

一兩去積微炒

敗鼓皮

炙令黃焦

白頭翁

甘草

炙微赤劉

藍青

各半兩

犀角

屑

白囊荷根

黃芩

茜根

劉各三分

右件藥搗麤羅為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓放溫不計時候量兒大小分減服之

聖惠犀角散

治小兒蠱毒血痢發盛心神煩悶腹脹

不欲飲食

犀角

屑

白蘘荷根

地榆

微炙

桔梗

去

頭

蘇枋木

劉各三分

右件藥搗麤羅為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓不計時候量兒大小分減溫服

嬰孺蘘荷根湯

治小兒蠱毒痢

白蘘荷根

八分

犀角

屑穀皮

四寸

升麻

十分

甘草

四分

藍青

一分

豉

三合

分七

右以水四升煮一升二合二歲兒為三服

嬰孺犀角煎

治小兒穀

挾

毒

地脉草

黃連

歲

麋

各十分

黃蘗

竹茹

蒿草

各八分

蜜

一升

人參

六分

牡

蠣

十分

梁州櫟皮

十四分

乾藍

四分

犀角

屑

甘草

各五分

右切以水一斗煮及二升半絞去滓下蜜上火煎餘

二升三歲一合三四歲一合半日二夜一量與之

張渙白頭翁散 治蠱毒痢及肛門脫出 白頭翁

黃連

去鬚微炒

茜根

剉焙乾

蘇枋木

鼓皮

炙令黃焦各一

兩

犀角

屑

地榆

炙剉各半兩

甘草

一分炙

右件搗羅為細末每服一錢水一小盞煎六分去滓服量兒大小加減乳食前

地榆丹 消毒止痢 地榆 炙剉 黃連 乾藍葉 川升

麻

各一兩

川棟子

苦楝根

各半兩

右件搗羅為細末軟飯和丸黍米大每服十粒米飲

下量兒大小加減乳食前

宣連丸

治毒痢

宣連

一錢作散用雞子清和作餅於瓦上燒乾再為末肉

豆蔻

一箇去心臍內入乳香不拘多少紙裏火煨黃色

朱砂

木香

各半錢

杏仁

七粒和皮燒

巴豆

四粒燒七粒亦得

右為末醋糊丸如蘿蔔子大陳米飲下七粒赤痢槐

花湯下

寶童方

治臟毒痢為喫諸藥不愈者

槐花

半兩炒

白

礬

一兩

右為末每服一錢用陳米飲下

孔氏家傳治蠱小品方 取薺芫根搗末以飲服方寸

七立差 一方入地榆臭椿根同服

雙金飲 治下痢赤白晝夜頻數及泄瀉經久

叔澀大瞿栗殼

去蒂剉碎蜜水炒透候乾一兩

大川芎

剉碎醇醋炒透候乾半兩

右二味再曬或焙為末每服一錢至二錢用米清

湯空心調服或溫蜜湯下

萬金散 治水瀉下痢久不瘥者

瞿栗殼

去蒂二兩一兩剉碎

醋蜜炒一兩生用

甘草

不去節二兩一兩炙一兩生用

陳皮

去白二兩烏梅和核

一兩

右碎每服二錢熱湯一盞略煎二沸和查傾出盞內

上以盞蓋定候澄清去滓空心溫服

神効散 治赤白痢晝夜頻數食減腹痛小便不利

罌粟殼

去蒂剉碎梗蜜炙炒

白芷

烏梅

和核各一兩

乳香

撫

芎

各半兩

右碎每服二錢水一盞煎七分空心溫服

補養補中益氣湯

虛熱

四君子湯

吐瀉

六君子湯

吐瀉

異功散

吐瀉

參苓白朮散

不乳食

升陽益胃湯

黃耆

二錢

半夏

人參

甘草

炙

白朮

黃連

炒各一錢

獨活

防風

白芍藥

羌活

各五分

陳

皮

茯苓

柴胡

澤瀉

各三分

右水二鍾薑三片棗二枚煎四分食遠服

證治準繩卷九十